



Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y Prueba del PAP



CONVENIO 10-CO1-063 / "Mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres Paraguayas Apoyando el Plan Nacional de Prevención de Cáncer de Cérvix del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay".

Introducción

Este material ha sido realizado para ayudar a los Equipos de Salud, Puestos y Centros de Salud y todo personal de blanco del Paraguay en el conocimiento, la difusión y educación relacionados a la prevención del cáncer del cuello uterino, con la toma correcta del Papanicolaou.

La redacción es sencilla, comprensible y fácilmente aceptada por la mujer que será atendida en los consultorios ginecológicos. Acompañado de una buena explicación con educación, respeto y equidad estamos seguros que será muy útil en la lucha eficaz contra esta enfermedad que hoy día es prevenible, evitable y curable en los estadios tempranos.

Dr. Antonio Carlos Barrios. Ministro
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dra. Ma. Teresa Baran. Vice Ministra
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dra. Lida Sosa Argüello. Directora General
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD

Dr. Juan Carlos Alvarenga. Director
PROGRAMA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER

Dra. Nelly Elena Maldonado. Jefa
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN PRECOZ
Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA

Apoyo técnico del UNFPA:
Dra. Adriane Salinas Bomfim
OFICIAL NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

A través de:
FUNDACIÓN DE RELIGIOSOS PARA LA SALUD - FRS

Financiado por:
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO - AECID

CONVENIO 10-CO1-063

“Mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres Paraguayas Apoyando El Plan Nacional de Prevención de Cáncer de Cérvix del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay”



PRONAC



¡Evitemos muertes por Cáncer de Cuello Uterino!



Derecho a la Salud



GUÍA
LAMINA

Derecho a la Salud

Todas las mujeres paraguayas tienen derecho a recibir la prestación de servicios gratuitos para la detección y el control del cáncer de cuello uterino.

Las mujeres con diagnóstico de cáncer deben recibir apoyo psicológico de contención.


El congreso de la nación decreta día libre con goce de sueldo para la realización del pap y mamografía-ley 3803.

PARA DINAMIZAR:


Preguntar al auditorio si conoce qué artículo de la ley habla sobre el derecho a la salud. Cap. VI, Art 68

Conociendo Nuestro Cuerpo

GENITALES INTERNOS



GENITALES EXTERNOS



Conociendo Nuestro Cuerpo

ÓRGANOS SEXUALES INTERNOS:

- La vagina: es como un tubo que mide 7 u 8 centímetros que conecta al útero con la vulva. Se abre y se ensancha para cumplir sus funciones; es decir: cuando la usamos durante las relaciones sexuales; cuando sale el bebé en el parto vaginal; cuando sale la sangre de la menstruación.
- El útero: tiene la forma de una pera. Se conecta con la vagina a través del cuello uterino. El cuello del útero es lo que se observa para detectar infecciones o cáncer de cuello uterino.
- El Endometrio: es la parte interna que cubre al útero, donde se aloja el feto y se descama como menstruación cuando no hay embarazo.

ÓRGANOS SEXUALES EXTERNOS:

- Monte de Venus: es una parte con acumulación de grasa, cubierta de vellos o pelitos.
- Clítoris: es un pequeño bultito carnosos muy sensible y está en la unión de los labios menores.
- Meato urinario: es el orificio por donde orinamos y se encuentra debajo del clítoris.
- Entrada de la vagina: es por donde sale el sangrado de la menstruación, por donde entra el pene del hombre en las relaciones sexuales y por donde sale el recién nacido en el parto vaginal.
- Labios menores y mayores: son los pliegues carnosos que rodean y protegen la entrada de la vagina, donde está ubicado el cuello uterino.
- El ano: es el orificio por donde sale la materia fecal.


Cuidados de nuestro cuerpo

LAVADO CORRECTO DE GENITALES EXTERNOS




LIMPIARSE DESPUÉS DE IR AL BAÑO:




Uso papel sanitario y lo paso de adelante hacia atrás.
Tomo otro papel, repito hasta que salga limpio



AUTOEXAMEN DE MAMA: Inspección manual



Con las puntas de los dedos juntas, palpar con gentileza cada seno en todas estas direcciones.



MAMOGRAFÍA




GUÍA

LAMINA

Cuidados de Nuestro Cuerpo

- 01: Las mujeres deben lavarse con agua y jabón neutro las partes externas de los órganos sexuales.
- 02: Como el ano está cerca de la entrada de la vagina, hay que tener cuidado al limpiarse de adelante hacia atrás para evitar que la materia fecal sea arrastrada hacia la vagina.
- 03: Para higienizarse, echar el agua de adelante hacia atrás con un jarrito.
(El uso del bidet no es recomendable)
- 04: No hacer lavados internos o meter yuyos dentro de la vagina porque produce irritación y cambia su humedad, puede dar lugar a infecciones.
- 05: Acudir a controles anuales para revisión, realizar estudio de cuello uterino, Papanicolaou y colposcopia si lo amerita y mamografía si se es mayor de 40 años.
- 06: Cuando se tiene flujo con mal olor, ardor, picazón o dolor, se debe acudir enseguida a consultar al establecimiento de salud más cercano.

Secreción Vaginal Normal



Secreción Vaginal Normal

- A lo largo del mes, la secreción vaginal cambia en cantidad y también en espesor. Algunos días es como la clara del huevo, y otros días es más blanquecina, o más espesa, especialmente cerca de la regla o menstruación.
- Aumenta cuando existen ganas de tener relaciones sexuales y también en el embarazo.
- Puede disminuir cuando se da de mamar a los hijos y también cuando se presenta la menopausia.


Infecciones Vaginales y Flujo




**VAGINITIS POR
TRICOMONAS**



**VULVOVAGINITIS
MONILIÁSICA**
(infección vaginal
por hongos)



VULVOVAGINITIS CANDIDIÁSICA




Infecciones Vaginales y Flujo

Pensamos que estamos con infección o inflamación cuando:

- Cambia el olor, el color y la cantidad de la secreción que baja.
- Cuando esa secreción es de color blanco, amarillo o verdoso o amarronado que moja y mancha la ropa interior.
- Cuando tiene olor a pescado descompuesto, putrefacto o un olor ácido muy fuerte.
- Cuando arde, pica o duele, tanto al tener o no relaciones sexuales.
- Cuando se irritan los genitales externos, se hinchan, pican, se enrojecen o tienen pequeñas lesiones.

¿Cómo se Adquieren las Infecciones Vaginales?



¿Cómo se Adquieren las Infecciones Vaginales?

- Algunas infecciones vaginales se adquieren por higiene incorrecta.
- La higiene, de preferencia debe ser con agua por chorro, ducha o tirada con un jarro, siempre de adelante hacia atrás y no realizar lavados internos de la vagina.
Tampoco se deben hacer lavados con agua y yuyos.
- Otras, por transmisión sexual: como son la sífilis, la gonorrea, la tricomoniasis y la clamidiasis, de ahí que es importante el uso del condón.

Conociendo y Previniendo el Cáncer de Cuello Uterino





Conociendo y Previniendo el Cáncer de Cuello Uterino

¿Qué es el cáncer?

- Es el cambio de características de las células que forman nuestro cuerpo, adquiriendo formas anormales, crecimiento desordenado, inmadurez, etc., pudiendo formar tumores.
- Las células cancerígenas si no son destruidas por nuestro sistema de defensa, crecen, si no las detectamos a tiempo y tratamos se desarrollan tumores y se pueden expandir a diferentes órganos.
- Hay cánceres que crecen más rápido y otros más lento, como el cáncer de cuello uterino.

Evolución del Cáncer de Cuello Uterino



Evolución del Cáncer de Cuello Uterino

En la mayoría de los casos, es la consecuencia de una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

- Se inicia en la superficie del cuello uterino.
- El cáncer cervicouterino está causado por la infección con un virus: Virus del Papiloma Humano (VPH).
- La mayoría de las veces, la infección por el VPH desaparece sin tratamiento; sin embargo, a veces, permanece durante años y es así cuando puede producir cáncer de cuello uterino, vulva, ano, boca y garganta.

PARA COMENTAR:

el cáncer de cuello uterino es la 2da causa de muerte por tumores de las mujeres en Paraguay y en muchos países de America Latina.

- Esta infección crónica con el HPV puede pasar a una etapa de lesiones precancerosas que no suele tener ningún síntoma o signo, pero se puede detectar con pruebas como el Papanicolaou y la colposcopia.
- Si no se detectan y tratan estas lesiones, con el tiempo puede llegar a transformarse en cáncer.
- Entonces debemos insistir en la detección temprana y el tratamiento oportuno de las lesiones producidas por el VPH.


Factores de Riesgo

- promiscuidad
- mala alimentación
- ser fumador
- desnutrición




Factores de Riesgo

- **Infección de VPH:** Los VPH son un grupo de virus de transmisión sexual, cuya infección crónica puede producir cáncer de cuello uterino. El VPH es la causa de casi todos los cánceres de cuello uterino. Las infecciones por VPH son muy comunes.
- **No hacerse Papanicolaou en forma periódica desde que se inician las relaciones sexuales:** Si los cambios producidos por el VPH se detectan temprano, se puede prevenir el cáncer cervical al extraer o destruir las lesiones antes de que puedan convertirse en células cancerosas. (Aunque ya no se tenga relaciones sexuales es importante realizarse periódicamente la prueba de Papanicolaou).
- **Tener o haber tenido varios compañeros sexuales o una pareja que a su vez tiene o tuvo varios compañeros.**
- **Fumar**
- **Desnutrición, deficiencia de vitaminas C, E, ácido fólico.**
- **Tener otras infecciones de transmisión sexual como el VIH, o que comprometan el sistema inmunológico o de defensa del organismo**
- **Tener 5 o más hijos.**




Un factor de riesgo es aquel que aumenta la probabilidad de padecer una enfermedad.




¿Cómo se Previene el Cáncer de Cuello Uterino?

Prevención de la Infección por el VPH

Viva un estilo de vida saludable



Hágase un chequeo de salud cada año



Prevención de la Infección por el VPH



Hágase un
chequeo de
salud cada año

Como prevenir la infección con VPH genital:

- Abstención total del contacto genital directo y del coito, ya que se adquiere el VPH por contacto sexual con o sin penetración.
- Vacunarse contra el VPH.
- Otras medidas que incorporadas a nuestro comportamiento sexual ofrecen cierta protección contra el VPH: uso sistemático y correcto de preservativos, retrasar el inicio de la primera relación sexual.
- Fomentar la fidelidad de la pareja.
- Haga ejercicios de forma rutinaria.
- Mantenga una alimentación variada, con frutas y verduras.
- No fume.

Vacunación Contra el VPH




Vacunación Contra el VPH

- Una forma ideal de prevenir la infección por el VPH es mediante la vacunación, antes de iniciar las relaciones sexuales.
- La vacuna tetravalente protege contra los 4 principales tipos de VPH que infectan a las personas: 6 y 11 que causan las verrugas genitales, 16 y 18 responsables de la mayoría de los cánceres de cuello uterino.
- Esta vacuna produce anticuerpos contra estos tipos de virus y evita el desarrollo de las lesiones.
- Está recomendada para la aplicación a partir de los 9 años.

Uso de Condones y Prevención de VPH

El uso correcto y sistemático del condón, disminuye la probabilidad de contagio con el VPH.



Uso de Condones y Prevención de VPH

- Reduce el riesgo de contraer verrugas genitales.
- Protege contra otras infecciones de transmisión sexual (ITS), incluidas las infecciones por clamidias y el Virus del Herpes.
- Protege contra la infección por el VIH, un conocido facilitador de la infección por VPH, ya que produce una deficiencia del sistema inmunitario.
- Previene un embarazo no deseado.

GUÍA
LAMINA

¿Cómo se Previene el Cáncer de Cuello Uterino?

USAR
PRESERVATIVOS



NO FUMAR

ALIMENTARSE BIEN





APLICARSE LA VACUNA



¿Cómo se Previene el Cáncer de Cuello Uterino?

- Retrase el inicio de las relaciones sexuales: Las mujeres jóvenes son más vulnerables al contagio del VPH ya que llegan a cambiar varias veces de parejas sexuales.
- Las mujeres que han tenido 5 o más hijos tienen más posibilidades de desarrollar cáncer cervicouterino. Planifique embarazos, ya que el daño que sufre el cuello con los partos lo expone más hacia la vagina.
- Evite tener varias parejas sexuales sin protección, ya que es mayor la posibilidad de contraer una infección de transmisión sexual como el VPH y el VIH/sida.
- Use preservativos, se ha visto que protegen contra las infecciones de transmisión sexual y reducen el riesgo de contraer VPH.
- No fume o trate de dejar de fumar, el tabaco aumenta el riesgo de enfermar de casi todas las clases de cáncer, incluido el cervicouterino.
- Busque tratamiento médico de inmediato si usted o su pareja tienen síntomas o sospecha de una infección de transmisión sexual.
- Realice una prueba de PAP cada año. Casi todas las mujeres que tuvieron relaciones sexuales probablemente se han expuesto al VPH. El Papanicolaou puede detectar lesiones incipientes, de manera que se las puede tratar antes de que progresen a cáncer.
- Mensaje especial para varones: eviten tener varias parejas sexuales sin protección y utilicen siempre preservativos, especialmente con las parejas nuevas u ocasionales.
- Mantenga una alimentación variada y saludable.

Prueba de Papanicolaou



Prueba de Papanicolaou

- ¿Quiénes deben hacerse? Todas las mujeres deben hacerse la prueba de PAP a partir del año de inicio de su vida sexual, aunque ya no tengan e inclusive embarazadas.
- ¿Cada cuánto? Al menos una vez cada año.
- ¿En qué consiste? En un ambiente donde se garantice tu privacidad y confidencialidad te harán el estudio. Primero toman tus datos y te hacen preguntas que ayudan a orientar el diagnóstico. Luego, se pasa al examen físico, para lo cual debes sacarte la ropa interior y acostarte en la camilla en posición ginecológica. Para poder ver tu cuello uterino es necesario que te coloquen un aparatito que abrirá delicadamente tu vagina llamado espéculo. A continuación, tomarán una muestra pasando una espátula (palito) de madera por la superficie externa de tu cuello uterino y con un cepillito suave de adentro del cuello uterino. Esa muestra se coloca sobre una lámina de vidrio con tu nombre y la fecha. En el laboratorio la tiñen y miran al microscopio para encontrar si hay células cancerígenas.

El resultado que recibís, es el informe de lo que vió la persona profesional que tomó la muestra y la que miró la lámina. El PAP recién está completo cuando recibís tu resultado y consultás con el mismo.

- ¿Qué se necesita para hacerse la prueba? No estar menstruando y no colocarse óvulos o cremas vaginales 1 semana antes de la prueba, relajarse y ya. (Es ideal no tener relaciones sexuales el día antes)

IMPORTANTE:


- Volver al establecimiento de salud por los resultados o el seguimiento.
- Explicarle a la mujer que recibirá información detallada de los procedimientos clínicos y que puede aceptar o rechazar cualquiera de ellos (consentimiento informado)
- Decirle que está permitido que alguien la acompañe si lo desea.
- Ser sinceros/as con la fecha de entrega de resultados.

Mitos y Realidades Sobre el PAP




Mitos y Realidades Sobre el PAP

| MITOS | VERDADES |
|---|---|
| El PAP produce aborto. | No produce aborto, se puede realizar hasta un poco antes del parto. |
| El PAP es doloroso. Produce heridas. | El PAP no duele, es rápido y sencillo. No produce heridas ya que se toma delicadamente las células de la superficie del cuello uterino. |
| No hay antecedentes familiares de cáncer, no tengo síntomas de cáncer. | Todas las mujeres que hayan tenido alguna vez relaciones sexuales pueden desarrollar cáncer de cuello uterino. |
| Los dispositivos intrauterinos (DIU) producen cáncer cervicouterino. | Los DIU no se asocian con ningún aumento de cáncer cervicouterino. |
| Puede adquirir infecciones. | El PAP se realiza con espéculos limpios, estériles o desechables. |
| No vale la pena hacerse el PAP ya que solo sirve para saber si una mujer tiene enfermedad mortal e incurable. | El PAP puede detectar anomalías antes de que se conviertan en cáncer. Asimismo, si el propio cáncer se detecta enseguida puede curarse con el tratamiento adecuado. |



Rol de los Varones en la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino

Varones en la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino



GUÍA

LAMINA

Varones en la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino

- Este cáncer se desarrolla lentamente, iniciando con una etapa de lesiones precancerosas, que se puede detectar mediante estudios como el Papanicolaou, la colposcopia y tratar. El VPH en los varones puede aumentar el riesgo de cáncer del pene y ano.
- El cáncer cervicouterino surge por una infección de transmisión sexual producida por el virus del papiloma humano (VPH) y no provoca síntomas. La infección por el VPH se transmite sexualmente, pero la penetración no es esencial, ya que el virus puede vivir en la piel, fuera de la zona genital.

Siendo varón, cómo puedes contribuir a reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino?

- Retrasando el inicio de las relaciones sexuales hasta la etapa adulta. Planificando y usando métodos anticonceptivos con sus parejas para evitar embarazos no planificados y el embarazo a temprana edad.
- Evitando tener varias parejas sexuales y sin protección durante las relaciones sexuales.
- Usando preservativos para prevenir las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/sida y previniendo el cáncer cervicouterino y de pene.
- Apoyando a sus hijas, sobrinas y nietas a vacunarse contra el VPH o HPV.

GUÍA

LAMINA

Varones en la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino

- Apoyando y alentando a su pareja y a las mujeres de su familia a hacerse cada año, máximo cada tres años la prueba de Papanicolaou luego de haber iniciado las relaciones sexuales.
- No fumando y ayudando a sus parejas a no hacerlo. El tabaquismo puede aumentar el riesgo de muchas clases de cáncer en los varones y las mujeres, incluido el cáncer cervicouterino.
- Si a tu compañera se le detecta alguna lesión precancerosa o cáncer, apoyarla y ayudarla a obtener el tratamiento recomendado, acompañándola a las consultas con el médico e informándote sobre el cáncer cervicouterino.
- Cooperando con tu pareja cuando en el consultorio se les pida que se abstengan relaciones sexuales, como puede suceder tras algunas pruebas y tratamientos.
- Aliviando la carga laboral de tu compañera mientras se le hace tratamiento quirúrgico, quimioterapia o radioterapia por un cáncer cervicouterino. Tales tratamientos pueden ayudar a prevenir y/o curar el cáncer, pero pueden hacer que la mujer se sienta cansada y débil, por lo que necesitará tiempo para descansar y recuperarse.
- Si tu compañera está con un cáncer muy avanzado, puedes ayudarla ofreciéndole un máximo de comodidad y calidez en el trato.

Síntomas de Cáncer de Cuello Uterino

Hágase la prueba de PAP y exámenes ginecológicos anuales, antes de que aparezcan síntomas.



Síntomas de Cáncer de Cuello Uterino

- Sangrado vaginal anormal, como el sangrado después de tener relaciones sexuales, sangrado después de la menopausia, sangrado y manchado durante el tiempo entre una menstruación y otra o menstruaciones que duran más tiempo o con sangrado más profuso de lo normal. También puede ocurrir sangrado después del examen ginecológico.
- Alguna secreción vaginal inusual (aparte de su periodo menstrual mensual normal).
- Dolor durante las relaciones sexuales.

Por supuesto, estos síntomas no significan que usted tiene cáncer. También pueden ser causados por otra causa, pero debe consultar con su médico para saberlo.

Hágase la prueba de PAP y exámenes ginecológicos anuales, antes de que aparezcan síntomas.

Consejería para entrega de Resultados



Consejería Para Entrega de Resultados

Resultado Normal

- Si la prueba de detección es negativa, quiere decir que por el momento no presenta modificaciones que puedan convertirse en un cáncer cervicouterino.
- Es importante repetir anualmente la prueba de PAP.


Resultado Inflamatorio

- Tener inflamación no es igual a tener una lesión pre-cancerígena o a tener cáncer.
- Cuando hay inflamación no se pueden ver con claridad las células del cuello uterino, como cuando vemos a través de un vidrio empañado.
- Tratar la inflamación permite ver correctamente a las células del cuello uterino.
- Es por eso que debes seguir el tratamiento indicado por el profesional de salud y repetir la prueba de Papanicolaou a los 3 meses.


¿Qué Hacer Ante Resultados Anormales?

Y son gratuitos en todos los Servicios de Salud del MSPyBS

Ahora colposcopia y biopsia para decidir tratamiento



LEEP



¿Qué Hacer Ante Resultados Anormales?

- No alarmarse.
- Se le remitirá a algún servicio para que le completen los estudios realizándose colposcopia y biopsia.
- La biopsia consiste en tomar una pequeña muestra para mirar detenidamente y poder completar el diagnóstico.
- Según su resultado le ofrecerán los posibles tratamientos.
- Los tratamientos para las lesiones precursoras pueden ser crioterapia que consiste en aplicar un intenso frio a través de un criopovo y destruir así las lesiones, o escisión con Asa

El PAP, la colposcopia y el tratamiento de las lesiones precancerosas de Cáncer de Cuello Uterino, son gratuitos en todos los servicios de salud del MSPyBS.

- de Leep que consiste en sacar una pequeña porción de tejido que está con las células anormales bajo anestesia local. Ambos son ambulatorios y permiten que la paciente regrese a su hogar el mismo día.
- Las verrugas genitales o condilomas se cauterizan con ácido tricloroacético – ATA 80% y se pueden tratar durante el embarazo.

Centros de Referencia

Diagnóstico de Cáncer de cuello uterino

- Centro de Salud Alfonso Godoy
- Hospital Distrital de Lambaré
- Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso
- Hospital Distrital de Fernando de la Mora
- Hospital Distrital de Capiatá
- Hospital Distrital de Ñemby
- Hospital Distrital de Villa Elisa
- Hospital Calle'i
- Hospital Caaguazú
- Centro de Salud N°3 "Domingo Savio"
- Centro de Salud N°4 "Santísima Trinidad"
- Centro de Salud N°7 "Barrio Fátima"
- Centro de Salud N°8 "Barrio Sajonia"
- Centro de Salud N°9 "Barrio Bernardino Caballero"
- Centro de Salud N°11 "Barrio Republicano"
- Centro de Salud N°12 "Dr. Valerio Fernández"

Lesiones precursoras de Cáncer de cuello uterino

- Hospital Nacional de Itaguá "Blanca Menrath"
- Hospital Regional de Luque
- Instituto Nacional del Cáncer
- Hospital Distrital de Lambaré
- Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso
- Hospital Calle'i
- Centro de Salud N° 4 "Santísima Trinidad"
- Clínica de Tumores Instituto "María Josefa Barbero"
- Hospital Materno Infantil "San Pablo"
- Hospital Regional de Encarnación
- Hospital Distrital de Minga Guazú
- Hospital Regional de Coronel Oviedo

Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y Prueba del PAP

Para charlas en salas de espera y en la comunidad

CONVENIO 10-CO1-063

“Mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres Paraguayas Apoyando El Plan Nacional de Prevención de Cáncer de Cérvix del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay”



PRONAC



Diseño, Diagramación e Ilustraciones: Buró Creativo / www.buro.com.py